

**NOTICE : INFORMATION DE L'UTILISATEUR****CHLORAMPHENICOL 0,5 % Collyre en solution  
CHLORAMPHENICOL 1 % Pommade ophtalmique****Veillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant d'utiliser ce médicament.**

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été prescrit personnellement. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien.

Dans cette notice

1. Qu'est-ce que CHLORAMPHENICOL 0,5% Collyre en solution / 1% Pommade ophtalmique et dans quel cas sont-ils utilisés ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser CHLORAMPHENICOL 0,5% Collyre en solution / 1% Pommade ophtalmique ?
3. Comment utiliser CHLORAMPHENICOL 0,5% Collyre en solution / 1% Pommade ophtalmique ?
4. Les effets indésirables éventuels.
5. Comment conserver CHLORAMPHENICOL 0,5 % Collyre en solution / 1 Pommade ophtalmique ?
6. Informations supplémentaires.

**1. Qu'est-ce que CHLORAMPHENICOL 0,5% Collyre en solution / 1% Pommade ophtalmique et dans quels cas sont-ils utilisés ?**

Préparations pour les yeux qui contiennent du chloramphenicol, un antibiotique qui empêche la multiplication des bactéries.

Indications :

- traitement de certaines infections de l'œil et de la paupière, par des bactéries sensibles au chloramphénicol, telles que conjonctivites et infections de la cornée ;
- prévention et traitement des infections bactériennes après traumatismes, chirurgie et extraction de corps étrangers.

**2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre CHLORAMPHENICOL 0,5% Collyre en solution / 1% Pommade ophtalmique ?****N'administrez pas CHLORAMPHENICOL :**

- si vous êtes allergique au chloramphenicol ou à l'un des autres composants de la spécialité concernée;
- en cas de troubles antérieurs du sang;
- au nouveau-né.

**Faites attention avec CHLORAMPHENICOL :**

- ne pas boire les gouttes CHLORAMPHENICOL ni les mélanger à un autre liquide ou médicament pour les yeux;
- ces produits sont stériles : veiller à les utiliser proprement et à bien refermer le flacon ou le tube;
- par prudence, enlever les lentilles de contact avant d'appliquer le traitement;
- en cas d'effet non désiré (allergie, trop forte dose, problème de lentilles...) ou en l'absence d'amélioration, arrêter le traitement et consulter le médecin.

**Utilisation de CHLORAMPHENICOL en association avec d'autres médicaments**

Veillez informer votre médecin ou votre pharmacien si vous prenez d'autres médicaments ou si vous en avez pris récemment même s'il s'agit de médicaments sans ordonnance.

Evitez d'utiliser CHLORAMPHENICOL en même temps qu'un sulfamide, un antibiotique ou un

médicament qui peut avoir une influence sur le sang.

**Aliments et boissons**

sans objet

**Grossesse et allaitement**

CHLORAMPHENICOL ne sera pas utilisé au cours de la grossesse et de la période d'allaitement. Veuillez demander conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

**Conduite de véhicules et utilisation de machines**

Comme toutes les pommades pour les yeux, l'utilisation de CHLORAMPHENICOL Pommade ophtalmique peut rendre la vision trouble.

**Informations importantes concernant certains composants de CHLORAMPHENICOL**

sans objet

**3. Comment utiliser CHLORAMPHENICOL 0,5% Collyre en solution / 1% Pommade ophtalmique ?**

Veuillez suivre rigoureusement ces instructions, à moins que votre médecin vous en ait donné d'autres. En cas d'incertitude, veuillez consulter votre médecin ou votre pharmacien.

Administration par voie ophtalmique.

Posologie usuelle :

CHLORAMPHENICOL Collyre en solution:

Mettre 1 ou 2 gouttes dans l'œil atteint, 4 à 6 fois par heure pendant les 2 premières heures; ensuite 1 ou 2 gouttes, 4 fois par jour ou selon l'avis du médecin.

CHLORAMPHENICOL Pommade pour les yeux :

Mettre une petite quantité de pommade - volume d'un grain de blé - dans l'œil atteint, 2 à 6 fois par jour ou selon l'avis du médecin.

Après application de CHLORAMPHENICOL, presser avec le doigt l'angle interne de l'œil pendant 1 à 2 minutes pour favoriser la diffusion du médicament.

Les gouttes CHLORAMPHENICOL peuvent être utilisées pendant le jour et complétées par une application de pommade CHLORAMPHENICOL le soir au coucher, afin de maintenir l'effet thérapeutique pendant la nuit.

Après la disparition des signes infectieux, continuer le traitement pendant 1 à 2 jours puis arrêter.

Ne pas prolonger le traitement ni répéter les applications sans l'avis du médecin.

**Si vous avez utilisé plus de CHLORAMPHENICOL que vous n'auriez dû :**

Si vous avez utilisé trop de CHLORAMPHENICOL, arrêtez le traitement et prenez contact avec votre médecin, votre pharmacien ou le Centre Antipoisons (070/245 245).

**Si vous avez oublié d'administrer CHLORAMPHENICOL :**

Ne prenez jamais une double dose pour compenser la dose que vous avez oubliée.

**Si vous arrêtez d'utiliser CHLORAMPHENICOL :**

Consultez toujours votre médecin si vous envisagez d'arrêter le traitement.

**4. Effets indésirables éventuels**

Comme tous les médicaments, CHLORAMPHENICOL peut avoir des effets indésirables, bien que tous n'y soient pas sujets.

Si vous constatez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, ou si vous ressentez un des effets mentionnés comme étant sérieux, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

Dans de rares cas, des effets non désirés ont été constatés : réactions allergiques, chatouillements, sensation de gêne, de chaleur, de brûlure ou de gonflement au niveau de l'œil ou de la paupière, troubles du sang.

Afin de limiter les risques d'effets non désirés, bien respecter le mode d'emploi et la durée du traitement.

En cas de réaction, interrompre le traitement et consulter le médecin.

## **5. Comment conserver CHLORAMPHENICOL 0,5% Collyre en solution / 1 % Pommade ophtalmique ?**

Tenir hors de portée et hors de la vue des enfants.

CHLORAMPHENICOL Collyre en solution : au réfrigérateur (2-8°C)

Après ouverture du flacon, les gouttes CHLORAMPHENICOL peuvent être utilisées dans les 30 jours.

CHLORAMPHENICOL Pommade ophtalmique : à température ambiante (15-25°C)

N'utilisez plus CHLORAMPHENICOL après la date de péremption figurant sur l'emballage après la mention "Ex". La date d'expiration fait référence au dernier jour du mois.

## **6. Informations supplémentaires**

### **Que contient CHLORAMPHENICOL :**

La substance active est le chloramphenicol.

Les autres composants sont :

CHLORAMPHENICOL Collyre en solution : polyéthylène glycol 1540 – polyéthylène glycol 300 – acide borique crist. – tétraborate sodique crist. – tween – thiomersal – eau distillée.

CHLORAMPHENICOL Pommade ophtalmique : cholestérol – vaseline – paraffine liquide.

### **Qu'est-ce que CHLORAMPHENICOL et contenu de l'emballage extérieur :**

Collyre en solution: flacon compte-gouttes plastique 10 ml / pommade ophtalmique : tube de 4 g.

### **Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché :**

Meda Pharma s.a. – Chaussée de la Hulpe 166 – 1170 Bruxelles

### **Fabricants :**

Collyre en solution: Laboratoires Pharmaster – Erstein (France)

Pommade ophtalmique : ALCON CUSI – El Masnou/Barcelona (Espagne)

### **Numéros de l'autorisation de mise sur le marché :**

CHLORAMPHENICOL Collyre en solution : BE055431

CHLORAMPHENICOL Pommade ophtalmique : BE055596

**Mode de délivrance :** spécialités délivrées en pharmacie sur prescription médicale.

La dernière mise à jour de cette notice date de mai 2008.

**La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est 10/2008 .**